

ÉCHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE

POSSIBLES HÔTES: RENARD, CHIEN voir CHAT.

RÉSERVOIR

La L'échinocoque est avalé par l'hôte. Les animaux concernés sont essentiellement des canidés la larve se transforme en adulte dans le tube digestif de l'hôte, permettant la reproduction et le relargage d'œufs par le tube digestif. L'être humain constitue le plus souvent un « hôte en impasse » ne permettant pas la reproduction du parasite. Ce dernier traverse la paroi du tube digestif avant de s'implanter dans différents organes.

MODE DE CONTAMINATION

Par voie digestive en portant à la bouche des mains contaminées par des œufs du parasite présents sur des végétaux, le sol, le pelage de chiens ou de chats...

Le plus souvent par ingestion de végétaux contaminés (légumes, fruits, baies et salades sauvages, champignons), mangés crus ou peu cuits.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Fréquence des cas plutôt rare, uniquement dans les zones touchées par la maladie animale. Il existe un réseau de surveillance européen basé à Besançon.

CLINIQUE

Absence de symptôme (incubation), souvent pendant plusieurs années avec envahissement progressif du foie par le parasite. En l'absence de traitement, décès du malade.

CONDUITE À TENIR EN CAS D'EXPOSITION POSSIBLE

Consulter un médecin et lui préciser votre activité de piégeur.

TRAITEMENT APRÈS EXPOSITION

Le traitement des formes cystiques et alvéolaire, souvent coûteux et complexe, nécessite parfois une intervention chirurgicale lourde et/ou une chimiothérapie prolongée.

Quatre possibilités existent pour le traitement de l'échinococcose cystique:

- Traitement des kystes hydatiques au moyen de la technique PAIR (ponction, aspiration, injection, ré-aspiration);
- Chirurgie;
- Chimiothérapie anti-infectieuse; et attente vigilante.

TRAITEMENT PRÉVENTIF

- Se laver les mains (eau potable et savon) systématiquement :
 - Après contact avec les animaux, les déchets ou les déjections animales.
 - Avant les repas, les pauses, en fin de journée de travail.
- Si plaie : laver, savonner, puis rincer. Désinfecter et recouvrir d'un pansement imperméable.
- Vêtements de travail, gants, bottes : nettoyer régulièrement.

Dans les régions à risque

- Ne jamais manger de plantes ou de fruits sauvages crus (pissenlits, myrtilles, fraises...). Les laver et les cuire.
- Port de gants pour les travaux de plein air, et lors de la vermifugation des chiens et chats parasités.
- Lavage des mains après ces travaux et après le toilettage des animaux de compagnie.