

ORNITHOSE

POSSIBLES HÔTES : PIGEONS, POULES ET CANARDS.

RÉSERVOIR

Fin 2007, cette maladie a été détectée chez plus de 450 espèces d'oiseaux domestiques et sauvages.

MODE DE CONTAMINATION

Cette maladie se transmet par inhalation de poussières contaminées par les déjections d'oiseaux infectés. Ces derniers peuvent éventuellement être des porteurs asymptomatiques. Cette maladie est courante et difficile à éviter dans les élevages avicoles et très rarement contractées en côtoyant des oiseaux isolés. Les cas de transmission d'un mammifère à un autre sont extrêmement rares. Aucun cas de transmission via l'alimentation, ni interhumaine n'a été détecté. Cette zoonose revêt un caractère sporadique.

ÉPIDÉMIOLOGIE

C'est une maladie animale à déclaration obligatoire dans de nombreux pays ; c'est-à-dire que sa détection ou suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance de l'Autorité vétérinaire, conformément aux réglementations nationales. En Europe, une directive européenne l'a classée en 1999 dans la liste des zoonoses et agents zoonotiques à surveiller selon la situation épidémiologique, en respectant des modalités de surveillance particulière.

Cette maladie est reconnue comme maladie professionnelle.

CLINIQUE

L'incubation est de 5 à 19 jours. Les risques comportent une maladie souvent bénigne (fièvre, céphalées intenses, myalgies et toux sèche), avec formes aggravées rares (pneumopathies atypiques sévères voire mortelles), et parfois des formes non respiratoires : cardiaques, neurologiques, hépatiques, rénales, si aucun traitement n'est prescrit. Mais ils ne sont pas toujours présents et diffèrent selon la souche responsable de l'infection, selon l'âge de l'oiseau touché et selon son espèce.

CONDUITE À TENIR EN CAS D'EXPOSITION POSSIBLE

En cas d'arriver de symptômes, consulter votre médecin en précisant votre activité, surtout si vous piégez des pigeons.

TRAITEMENT APRÈS EXPOSITION

Traitement par antibiotiques.

TRAITEMENT PRÉVENTIF

Porter des moyens de protection type gants, masques en cas de manipulation de cadavres d'oiseaux ou de piégeage en espace confiné rassemblant un grand nombre d'oiseaux (clocher d'église rempli de pigeons).